

Klíště



Klíště se vyskytuje po celém území České republiky. Ve většině případů přenáší nejrůznější choroby. Například klíšťový zánět mozkových blan nebo lymfskou boreliózu. U některých onemocnění je vhodné preventivně prodělat očkování, a tím snížit riziko onemocnění.

Prevence

Kousnutí klíštětem je nejlépe předcházet. V oblastech se zvýšeným výskytem klíšťat byste měli nosit oblečení pokrývající celé tělo, užívat repelenty proti klíšťatům a nechat se preventivně očkovat. Po příchodu domů pravidelně prohlížet pokožku, není-li klíště někde přisáto.

První pomoc

Přisáté klíště musíte co nejdříve celé odstranit!

Klíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je desinfekční přípravek s jodem. Tinkтуру naneste v průměru cca 2,5 cm v okolí klíštěte. Víklavým pohybem pinzetou klíštěte uvolněte. Musíte ho odstranit úplně celé včetně hlavičky a kusadel. Po odstranění klíštěte ještě jednou místo kousnutí vydesinfikujte a ještě asi 3 dny ho kontroluj. Pokud se zvětšuje zánětlivý lem okolo místa přisátí klíštěte, vyhledejte lékařské ošetření. Léčba bude nejspíše vyžadovat antibiotika a speciální vyšetření krve.

Více rad a informací najdete na www.zachrannykruh.cz