Včelí, vosí a sršní bodnutí



Bodnutím hmyzem, jako jsou včely, vosy nebo sršni, dochází ke vstříknutí jedu do těla. Příznaky mohou být místní nebo celkové.

- Místní příznaky jsou:
  - bolestivost v místě bodnutí,
  - otok,
  - zarudnutí,
  - někdy svědění.



- Celkové příznaky jsou:
  - projevy alergie,
  - zarudnutí pokožky a to i na celém těle,
  - tvorba kopřivky,
  - svědění celého těla,
  - zhoršené obtížné sípavé dýchání,
  - kolaps, nevolnost, slabost.

První pomoc

Jsou-li příznaky místní, stačí vytáhnout žihadlo, pokud uvízlo v ráně. Opatrně! Včela zanechá při bodnutí v ráně žihadlo i s jedovým váčkem. Pokusíte-li se vytáhnout včelí žihadlo za tento váček, dojde naopak ke vstříknutí jedu do rány a stav se ještě horší. Proto musíte žihadlo opatrně vytáhnout pinzetou a uchopit jej pod jedovým váčkem. Vosa a sršeň žihadlo většinou nezanechávají.

Vhodné je okolí bodnutí ledovat nebo alespoň přikládejte studené obklady, které zpomalí rozvoj otoku. Pokud se neobjeví celkové příznaky, ani nemusíte volat lékařskou pomoc. Pokud se ale objevují příznaky celkové, okamžitě volejte lékařskou pomoc na lince 155.

Velkou pozornost věnujte bodnutí do obličeje, krku a hlavy. Závažné je žihadlo bodnuté do jazyka nebo do vnitřku úst. Ihned proto volejte záchrannou službu na čísle 155, protože hrozí otok jazyka a dutiny ústní, který může uzavřít dýchací cesty a způsobit dušení. Ledování a nebo alespoň studené obklady zpomalí rozvoj otoku, pacientovi při vědomí je možné podat do úst kostku ledu.



Více rad a informací najdete na www.zachrannykruh.cz